

# QUOI FAIRE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19



Fièvre



Toux ou mal de gorge



Perte du goût ou de l'odorat



## ISOLEZ-VOUS ET FAITES UN TEST RAPIDE À LA MAISON

Quoi faire selon le résultat obtenu ?



Les personnes qui vivent sous le même toit doivent aussi s'isoler.

1<sup>er</sup> test

### Positif

ISOLEZ-VOUS



### Négatif

ISOLEZ-VOUS et faites un 2<sup>e</sup> test 24 h plus tard



+



2<sup>e</sup> test

### Positif

ISOLEZ-VOUS



### Négatif

Reprenez vos activités en respectant les consignes sanitaires

## DURÉE DE L'ISOLEMENT

Si vous n'avez pas de tests rapides :

**isolez-vous**



L'isolement commence à partir de la date de début des symptômes ou du prélèvement si aucun symptôme.

12 ans et plus		Moins de 12 ans	Personnes immunosupprimées
Adéquatement vacciné	<b>5 JOURS*</b> (les 5 jours suivants avec le port du masque)	<b>5 JOURS</b> et refaire un test rapide après le 5 <sup>e</sup> jour.	<b>21 JOURS</b>
Non adéquatement vacciné	<b>10 JOURS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le test est <b>positif</b>, poursuivre l'isolement durant 5 jours supplémentaires.</li> <li>• Si le test est <b>négatif</b>, l'enfant peut reprendre ses activités.*</li> </ul>	

\* Si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.

[Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19)

Des particularités peuvent s'appliquer, consultez [Québec.ca/isolement](https://quebec.ca/isolement).